





経鼻栄養チューブの挿入直後の注意点
・チューブ挿入時は、気胸発生の恐れがあります



・チューブ挿入後、チューブの位置を確認する方法！



気泡音だけの確認は、チューブの位置を正確に把握することはできません。(肺内にチューブ先端があっても、音は聞こえるかもしれません。)

当院医療安全管理マニュアルNO2 胃管挿入を確認してください
医薬品医療機器総合機構PMDA 医療安全情報2014年2月引用
NST専門療法士 花原貴

内服の抗癌剤でも曝露対策は必要です！

内服の抗がん剤を投与する際にも曝露対策を行っていますか？曝露対策は、自分だけでなく、周囲にいる全ての人の身を守るために確実にいきましょう。

✓ 一重手袋 (服薬介助時)

経口投与



- < 自己管理可能 > **患者指導が必要**
- ・薬剤を潰したり、砕いたり、カプセル剤を**開けない**。
- ・薬に**触れない**ように内服するが、触れてしまったら必ず手を洗う。

- < 介助が必要 >
- ・介助者は一重手袋を装着して服薬介助する。
- ・薬杯が必要な場合は紙コップなど使い捨て容器を使用し、使用後はPPEと共に密閉して廃棄する。

✓ 二重手袋
✓ ガウン
✓ 保護メガネ
✓ サージカルマスク

経鼻チューブから投与



- ・PPE装着後、**簡易懸濁法**で溶解する。
- ・シリンジとチューブの接続をガーゼで覆う。
- ・チューブに抵抗があった場合は**無理に注入を継続せず**再度開通性の確認をする。
- ・使用した物品はビニール袋に入れて廃棄する。(物品は使い捨て)

わからないことや困ったことがありましたら
いつでもご相談ください。



がん化学療法看護認定看護師 前村香織
(PHS 7488)