

診療科名: 血液内科

# レジメン記入フォーマット

申請者名: \_\_\_\_\_

レジメン名称: Rituximab②バイオシマブ(前投薬あり) FL

\*最大8回投与

疾患名(癌種): CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫-濾胞性リンパ腫

適用目的(対象): 術前補助化学療法 術後補助化学療法 進行再発 一次 二次以降 三次以降 放射線併用 その他( ) ※併用するレジメンで異なる

フォーマットページ数( 1 / 1 )

通しNo	薬品名・規格	投与量	手技	点滴時間・速度	day( 1 )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	グラニセトロン注1mg	1袋	点滴注射	30分かけてゆっくりと	●									
	ポララミン注5mg	1A												
2	生理食塩液 500mL	1P	点滴注射	投与速度は別途指示参照	●									
	<b>リツキシマブ BS</b>	<b>375mg/m<sup>2</sup></b>		最初の30分は50mg/時										
	(1~2mg/mL溶液に調製)			で開始し、患者の状態を十分観察しながら、その後30分毎に50mg/時ずつ上げて、最大400mg/時まで上げることができる。										
	開始30分前までに													
	ロキソプロフェン 1T、又はカロナール 400mg内服													
				2回目以降										
				初回投与時に発現した副作用が軽微であった場合、100mg/時まで上げて投与を開始し、その後30分毎に100mg/時ずつ上げて、最大400mg/時まで上げることができる。										
3	生理食塩液	50ml	点滴注射	10分かけて	●									

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
2	リツキシマブ BS	375mg/m <sup>2</sup>	

インターバル日数 (7-21-28) 日

レジメン基準日 day( 1 )

総クール数 (4-6-8)クール

※この表にてオーダーリングにレジメン登録しますので、漏れなく記入して下さい。

【投与基準】

好中球 1000以上

末梢血 リンパ球数(腫瘍) < 25000/ml

レジメン登録コード

血内91

レジメン審査部会承認

2018.3.9承認