

診療科名: 内科

申請者名: \_\_\_\_\_

レジメン名称: EPd療法 (3cycle以降)

疾患名(癌種): 多発性骨髄腫 再発又は難治性

適用目的(対象): 術前補助化学療法 術後補助化学療法 進行再発 一次 二次以降 三次以降 放射線併用 その他( )

## レジメン記入フォーマット

フォーマットページ数( / )

通しNo	薬品名・規格	投与量	手技	点滴時間・速度	day( 1 )	day( )	day( 8 )	day( )	day( 15 )	day( )	day( 22 )	day( )	day( )	day( 28 )	
	Premedication														
①	レナデックス錠	28mg(8mg)	内服	エムプリシティ投与3時間前 (3~24時間前に内服)	◎										
	75歳以上はデキサメサゾン20mg/dlに減量 (適正使用ガイドは8mgだが、申請医師より適宜調整すること)						★		★		★				
	Frailty等によりさらに減量も可能であるが輸注反応に注意														
②	フェンヒドラミン(レスタミンコーワ)	50mg	内服	エムプリシティ投与前 (45~90分前までに内服)	■										
	カロナール	600mg			☆										
1	生理食塩液 50mL	1V	点滴注射	30分かけて	●										
	ファモチジン注20mg	1A	エムプリシティ投与1時間前までに完了												
	デキサート 6.6mg	1V													
2	生理食塩液 100mL	1V	点滴注射	60分かけて	▲										
3	エムプリシティ	20mg/kg	点滴注射		◆										
	注射用水	(25mg/ml)	300mg Vは13mLで、400mg Vは17mLで溶解												
	生理食塩液	250mL	(速度は、別途医師指示あればそれに従う)												
	フィルター付きルート使用		1回目												
	投与開始 0~30分:180mL/hr														
	生理食塩液は、体重50kg未満は150mLへ変更				投与開始 30分以降:240mL/hr										
	体重90kg超は350mLへ変更				2回目										
					300mL/hr(最大)										
4	生理食塩液 50mL	1V	点滴注射	30分かけて	△										
③	ボマリスト	4mg/日	内服	day 1~21 内服	→										
	投与量調整可能		(眼前)		21日間服用						7日間休薬				

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
3	エムプリシティ	10mg/kg	—
③	ボマリスト	4mg	—
	(適宜減量)		

インターバル日数 ( 28 )日

レジメン基準日 day(1, 8, 15, 22 )

総クール数 ( )クール

※この表にてオーダーリングにレジメン登録しますので、漏れなく記入して下さい。

【投与基準 (臨床試験を参考)	
好中球数 ≥ 1,000/μ L	AST, ALT ≤ 3 × UL
血小板数 ≥ 7.5万/μ L (3.0万/μ L)	
Hb ≥ 8.0g/dl	

・3サイクル目よりエムプリシティは4週ごとに投与1回で1サイクルとする。

・レナデックス錠やデキサメサゾン投与は、Infusion reactionの程度や

その他の副作用の程度に応じて調整可能

レジメン登録コード 血内116

レジメン審査部承認日 2019/12/13

レジメン変更承認日 \_\_\_\_\_