

診療科名: 外科

レジメン記入フォーマット

記入医師名: _____

レジメン名称: 放射線併用 FP療法 (700/70)[食道]

疾患名(癌種): 食道がん

催吐性リスク: 高度

適用目的(対象): 術前補助化学療法 術後補助化学療法 進行再発 一次 二次以降 三次以降 放射線併用 その他()

フォーマットページ数(1 / 1)

通しNo	薬品名・規格	投与量	手技	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(3)	day(4)	day(5)	day()	day()	day()	day()	day(28)
①	アプレピタントcapセット	1P	内服	day1~3 内服	●125mg	●80mg	●80mg							
1	フィジオ140 500mL	1P	点滴注射	2時間かけて	●									
2	ソルデム3A 500mL	1P	点滴注射	2時間かけて	●									
3	パロノセトロン0.75mg/50mL	1P	点滴注射	30分かけて										
	デキサート注射液 6.6mg	1V		側管より	●									
	デキサート注射液 1.65mg	2A												
4	生理食塩液 50mL	1P	点滴注射	30分かけて		●	●	●						
	デキサート注射液 6.6mg	1V		側管より										
5	生理食塩液 500mL	1P	点滴注射	2時間かけて	●									
	シスプラチン	70 mg/m²												
	全量 500mLとする													
6	生理食塩液 500mL	1P	点滴注射	24時間持続点滴	●	●	●	●						
	5-FU(フルオロウラシル)	700 mg/m²												
7	ソルデム1 500mL	1P	点滴注射	2時間かけて	●	●	●							
				側管より										
8	ソルデム1 500mL	1P	点滴注射	2時間かけて	●	●	●							
				側管より										
9	生理食塩液 50mL	1P	点滴注射	流し用				●						

※1 放射線治療と併用する
 ※2 心機能低下患者の場合は、
 補液量を調節すること

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
2	シスプラチン	70 mg/m²	—
3	5-FU(フルオロウラシル)	700 mg/m²	—

※この表にてオーダーリングにレジメン登録しますので、漏れなく記入して下さい。

インターバル日数 (28)日
 レジメン基準日 day(1-4)
 総クール数 (2)クール

【投与基準】
 白血球:4,000以上、血小板:10万以上、好中球:1,500以上、Ccr>30
 CDDPIは60>Ccr>45で75%dose、45>Ccr>31で50%doseに減量、30以下は中止

※FP-RT併用療法にて部分奏効が見られ、

レジメン登録コード 外97

完全奏効が認められる場合に限り、FP療法を2クール追加可能。

レジメン審査部会承認日 2020/8/14

--	--	--	--

レジメン変更承認日
