

# レジメン記入フォーマット

診療科名: 産婦人科

申請者名: \_\_\_\_\_

レジメン名称: GEM+BEV療法

疾患名(癌種): 卵巣癌・卵管癌・腹膜癌

適用目的(対象):  術前補助化学療法  術後補助化学療法  進行再発  一次  二次以降  三次以降  放射線併用  その他( )

フォーマットページ数( 1 / 1 )

通しNo	薬品名・規格	投与量	手技	点滴時間・速度	day( 1 )	day( )	day( 8 )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )	day( )
1	生理食塩液 250 mL	1 P	点滴注射	100mL/h	●		●							
				本体(ルートキープ用)										
2	生理食塩液 50 mL	1 P	点滴注射	15分かけて	●		●							
	デキササート 6.6mg	1 V	側管から											
3	5%ブドウ糖 100 mL	1 P	点滴注射	30分かけて	●		●							
	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	側管から											
4	生理食塩液 100 mL	1 P	点滴注射	初回90分・2回目60分	●									
	ペバシズマブ(アバステン)	15mg/kg		・3回目以降30分で投与										
5	生理食塩液 50 mL	1 P	点滴注射	流し用	●									

①生理食塩液 250mL (100mL/h)

└── ②生理食塩液50mL (15分かけて) 側管  
    デキササート

└── ③5%ブドウ糖液 100mL (30分かけて) 側管  
    ゲムシタピン

④生理食塩液 100mL 主管  
    ペバシズマブ(アバステン)

初回 90分  
2回目 60分  
3回目以降 30分

└── ⑤生理食塩液 50mL

上記表にて設定する抗がん剤について

通しNo	薬品名・規格	標準値	上限値
2	ゲムシタピン	1000mg/m <sup>2</sup>	
4	ペバシズマブ(アバステン)	15mg/kg	

インターバル日数 ( 21 )日  
レジメン基準日 day( 1, 8 )  
総クール数 ( )クール

※この表にてオーダーリングにレジメン登録しますので、漏れなく記入して下さい。

【投与基準】
白血球3000以上
好中球1000以上
血小板7万以上

- 【注意！】 消化管穿孔の発現リスクが高いと考えられる患者
- 3レジメン以上の化学療法前治療歴のある患者
  - 消化管など腹腔内の炎症を合併している患者

【文献】 The efficacy and Toxicity of Bevacizumab in Combination With Gemcitabine in Patients With Recurrent Ovarian Cancer. Kerris S. *et al*

レジメン登録コード 婦33  
レジメン審査部会承認日 2017.12.8